



214036, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15:
 тел. 8-952-533-83-88, 8-910-723-69-54, Андрей. e-mail : ramedros@yandex.ru
 www.belkarolin.com
 ОАО «Смоленский Банк», к/с 30101810700000000754
 р/с 40702810900000003769, ИНН 6731079913, КПП 673101001, БИК 046614754

Препараты собственного производства

Препарат	Упаковка	Показания	Дозировка и применение	Цена с НДС
Препараты для профилактики и лечения эндометритов				
«Тилозинокар» (ДВ – тилозина тартрат, каролин)	фл. 1000 мл	«Тилозинокар» обладает широким спектром противомикробного действия. Применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами. Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»	Вводят внутриматочно в дозе 20 мл на 100 кг массы тела с интервалом 48 часов до выздоровления.	293-30
Суспензия «Ниокситил» (ДВ – окситетрациклина гидрохлорид, тилозина тартрат, нитроксолин, пропранолола гидрохлорид)	фл. 1000 мл	Суспензия «Ниокситил» оказывает выраженное антимикробное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая анаэробы и грибы. Применяют крупному рогатому скоту для лечения и профилактики эндометритов. Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»	Вводят внутриматочно в дозе 10-15 см ³ /100 кг массы с интервалом 48-72 ч до выздоровления.	406-44
«Ниокситил форте» (ДВ – рифампицин, тилозина тартрат, нитроксолин)	фл. 1000 мл	Оказывает выраженное антимикробное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая анаэробы и грибы. Применяют крупному рогатому скоту для лечения и профилактики эндометритов. Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»	Вводят внутриматочно в дозе 10-15 см ³ /100 кг массы животного с интервалом 48-72 ч до выздоровления.	428-16
«Норфлоксатин» (ДВ – норфлоксацина никотинат, тинидазол)	фл. 1000 мл	Обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий. Применяют для лечения коров с воспалительными процессами матки (послеродовый эндометрит, хронический	Вводят внутриматочно в дозе 15-20 см ³ /100 кг массы с интервалом 48-72 ч до выздоровления.	440-00

		эндометрит) метрит, а также с профилактической целью после кесарева сечения, оказания родовспоможения и оперативного отделения последа. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»				
«Цефакар» (ДВ – β-каротин, цефазолина натриевая соль)	фл. 500 мл, 1000 мл	Обладает широким спектром противомикробного действия. «Цефакар» применяют для лечения коров, больных послеродовыми эндометритами. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»	Вводят внутриматочно в дозе 15-20 см ³ на 100 кг массы животного с интервалом 48 часов до выздоровления.	342-80		
Препараты для лечения маститов						
«Норфлоксамаст» (ДВ – норфлоксацина никотинат)	фл. 100 мл	Обладает широким спектром противомикробного действия. Применяют для лечения коров, больных клиническими и субклиническими маститами. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»	Вводят интрацистернально по 10,0 см ³ в большую долю вымени с интервалом 24 часа, до клинического выздоровления.	89-88		
Антибактериальные препараты						
Растворы «Тилобел 50 и 200» (ДВ – тилозина тартрат)	фл. 100 мл	Оказывает действие на большинство грамположительных микроорганизмов и некоторые грамотрицательные микроорганизмы. Назначают при респираторных заболеваниях животных, метритах, эндометритах, маститах, лептоспирозе, бактериальном отите, хирургических инфекциях, при энтеритах, дизентерии поросят, при бордетеллиозе и роже свиней, заразной агалактии у овец и коз, инфекционных артритов у свиней и ягнят, кампилобактериозе у коров и овец, панарициях. Можно применять вместо : -фармазин 50 -фармазин 200	Применяют внутримышечно с интервалом 24 часа в дозах:	62-40		
			Вид животных:	Тилобел -50	Тилобел - 200	127-80
			Крупный рогатый скот	-	0,05 см ³ /кг	
			Телята	0,2 см ³ /кг	0,05 см ³ /кг	
			Лошади	-	0,025 см ³ /кг	
			Свиньи	-	0,05 см ³ /кг	
			Мелкий рогатый скот	0,10 см ³ /кг		
			Собаки, кошки	0,2 см ³ /кг		
			Кролики	0,8 см ³ /кг		
Индейки	0,1-0,2 см ³ /кг					
Гель апрамицина сульфата 1% (ДВ – апрамицина сульфат)	фл. 1000 мл	Обладает преимущественным действием против грамотрицательных бактерий. Препарат оказывает бактериостатическое действие. Применяют поросятам-сосунам и телятам для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»	Препарат задают внутрь индивидуально в дозе 1,0 см ³ на 1,0 кг массы животного в течение 5-7 дней один раз в день с равными интервалами.	416-54		
Раствор апрамицина сульфата 20% (ДВ – апрамицина сульфат)	фл. 1000 мл	Обладает широким спектром антимикробного действия. Применяют для лечения молодняка сельскохозяйственных животных, собак при желудочно-кишечных и респираторных	Вводят внутримышечно один раз в день, в течение 5-7 дней в дозах: телятам, собакам - 0,1-0,2 см ³ /кг массы животного, поросятам, свиньям, ягнятам, овцам – 0,1 см ³ /кг массы животного.	295-00		

		заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к апрамицину (сальмонеллез, колибактериоз, бордетеллез), а также для лечения метрит-мастит-агалактии свиноматок. Можно использовать вместо: -апрамицина сульфат 20%, 100 мл БИОВЕТ(Болгария)		
Суспензия «Рифаприм» ДВ – триметоприм, сульфадимезин, рифампицин)	фл. 1000 мл	Обладает широким спектром антимикробного действия. Применяют крупному рогатому скоту и свиньям для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, инфекциях мягких тканей и кожи, вызванных возбудителями, чувствительными к препарату. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»	Внутрь индивидуально или групповым способом в дозе 0,2 см ³ /кг массы животного два раза в день в течение 5-7 дней.	446-40
Витаминные препараты				
Раствор «Белавит» (ДВ – стерильный раствор витаминов А, Д ₃ , Е)	фл. 100 мл	Является комплексным препаратом. Применяют при патологиях желудочно-кишечного и респираторного тракта молодняка животных и птиц, остеомаляции, рахите, лизухе, тетании, беломышечной болезни, дистрофии мышечной ткани, полиавитаминозах, экземах различного происхождения, трудно заживающих ранах и язвах, конъюнктивитах. Можно применять вместо: -тривитамин	Применяют внутримышечно или подкожно: крупному рогатому скоту и лошадям – 5,0 см ³ , жеребят и телятам – 1,5-2,0 см ³ , овцам и козам – 1,5 см ³ , ягнтятам и пороссятам – 0,5-1,0 см ³ , свиньям – 1,5-2,0 см ³ , курам – 0,2 см ³ , собакам – 0,5-1,0 см ³ , серебристо-черным лисицам – 0,5 см ³ , норкам – 0,2-0,3 см ³ . Препарат вводят один раз в 3-7 дней в зависимости от состояния животного в течение 3-4 недель.	60-00
«Каролин» (ДВ – β-каротин)	фл. 100 мл	Обладает антиоксидантным действием, является источником витамина А в организме животных. Применяют для профилактики субинволюции матки, послеродовых эндометритов и дисфункции яичников у коров, недостаточной функции желтого тела беременности. Оригинальный препарат ООО «Белкарولين»	Вводят внутримышечно по 20-30 мл на одно введение, 4-5 инъекций с интервалом 7 дней в сухостойном и послеродовом периодах.	66-00
Антигистаминные препараты				
«Аллервет 1%» (ДВ – дифенгидрамина гидрохлорид)	фл. 50 мл, 100 мл	Является антигистаминным средством. Применяют мелким домашним животным и молодняку сельскохозяйственных животных для профилактики и облегчения аллергических реакций, при сывороточной болезни, анафилаксии, анафилактическом шоке, зудящем и атопическом дерматите, аллергических конъюнктивитах, ринитах, полиартритах, суставном и мышечном	Вводят собакам и кошкам внутримышечно, подкожно в дозе 0,2-0,4 см ³ на кг массы животного три-четыре раза в день; молодняку сельскохозяйственных животных внутримышечно или подкожно – 0,025-0,1 см ³ на кг массы животного два-четыре раза в день.	51-20 58-80

		ревматизме. Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»		
«Аллервет 10%» (ДВ – дифенгидрамина гидрохлорид)	фл. 100 мл	Является антигистаминным средством. Применяют крупному рогатому скоту и свиньям для профилактики и облегчения аллергических реакций, при сывороточной болезни, анафилаксии, анафилактическом шоке, зудящем и атопическом дерматите, ожоговой и лучевой болезнях, аллергических конъюнктивитах, ринитах, полиартритах, суставном и мышечном ревматизме. Оригинальный препарат ООО «Белкаролин»	Вводят внутримышечно или подкожно в дозе 0,25-1,0 см ³ на 100 кг массы животного два-четыре раза в день.	75-00
Мази				
«Витемол» (ДВ – β-каротин)	банка 600 гр	Обладает противовоспалительным и кератопластическим действием, способствует регенерации тканей при нарушении целостности кожи вымени, препятствует проникновению микрофлоры в молочную железу.	Наносят на пораженные участки перед и после доения до клинического выздоровления. Для лечения и профилактики мастита один раз в день мазью обрабатывают соски и вымя в процессе массажа перед и после доения.	132-00
Мазь ихтамоловая 10%	банка 600 гр	Оказывает антисептическое, противовоспалительное действие. Применяют при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, тенденитах, тендовагинитах, бурситах, мастите.	Применяют наружно, нанося ее тонким ровным слоем 1-2 раза в день, до полного заживления пораженного участка кожи.	180-00

**МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАШИ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ВОЗМОЖНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВАС СКИДКИ ПО ЦЕНАМ!**